

そして、リアップ誕生から10年… 男性用発毛剤は新たなステージへ

有効成分ミノキシジル5倍量配合*

※当社従来品比



発毛。X5。



強く、太く、発毛。
新登場

第1類医薬品 〈効能・効果〉壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。 〈使用上の注意〉この医薬品は、薬剤師から説明を受け、「使用上の注意」をよく読んでお使い下さい。

リアップX5はここまで進化しました。


1 リアップを超える高い発毛効果を実現

下のグラフは、リアップX5(ミノキシジル5%製剤)と、リアップ(ミノキシジル1%製剤)の比較臨床データです。

医師の評価(使用24週後) 承認申請時添付データ ※リアップX5(n=140)、リアップ(n=142) n:被験者数

発毛効果比較データでは、薄くなった頭皮がほぼ完全に覆われる【著明改善】が4.3%。

薄くなった頭皮から発毛が始まる【中等度改善】が50.7%。軽微な毛髪成長【軽度改善】の38.6%を加えると93.6%の改善効果となりました。



著明改善…密度の高い毛髪成長(薄くなった領域がほぼ完全に覆われている。毛髪の密度は薄毛化していない領域とほぼ等しい)
 中等度改善…中等度の毛髪成長(薄くなった領域が、新発毛により部分的に覆われているが、薄くならなかった領域に比べると密度は低い【容易に識別できる】)
 軽度改善…軽微な毛髪成長(明確な毛髪成長がみられるが、薄くなった領域をかなり覆うというわけではない)
 不変…可視的毛髪成長なし
 悪化…毛髪成長の後退

リアップX5の副作用発現率8.7%
 (主な副作用…接触皮膚炎3.3%、湿疹3.3%、脂漏性皮膚炎2.0%)

リアップの副作用発現率5.3%
 (主な副作用…接触皮膚炎2.0%)

2 さらに使いやすくなった新容器



※1 容器本体をたてにした状態でキャップをはずしてください。



※2 塗布終了後、ノズルから薬液が出ないことを確認してからしめてください。まれにノズル周辺に白い結晶があらわれることがありますので、その場合はふきとってからご使用ください。

販売名	リアップX5	種別	第1類医薬品
成分・分量	100mL中 ミノキシジル5.0g 添加物:1,3-ブチレングリコール、 ジブチルヒドロキシトルエン、リン酸、エタノール	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。

用法・用量	成人男性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布する。
-------	--

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。)

- 次の人は使用しないでください。
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 女性。(本剤は日本人女性における安全性が確認されていないため、女性の方はミノキシジルを1%配合した「リアップレディ」をご使用ください。)
 - 未成年者(20歳未満)。(国内での使用経験がありません。)
 - 壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。(本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。)
 - 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。)
- 次の部位には使用しないでください。
 - 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。(血圧が下がる等のおそれがあります。)
 - きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。(きず等を悪化させることがあります。)
- 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。(これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。)

相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 今までに薬や化粧品によるアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - 高血圧の人、低血圧の人。(本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。)
 - 心臓又は腎臓に障害のある人。(本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。)
 - むくみのある人。(むくみを増強させる可能性が考えられます。)
 - 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。(壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。)
 - 高齢者(65歳以上)。(一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。)
 - 次の診断を受けている人。甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。(甲状腺疾患による脱毛の可能性ががあります。)
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	頭皮の発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ひけ、使用部位の熱感等
神 経 系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循環器系	胸の痛み、心拍が速くなる
代 謝 系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ

- 6ヵ月使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度。(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)(壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)
- 使用開始後6ヵ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛など。(壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)

その他の注意

- 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも4ヵ月間、毎日使用してください。(本剤の有効性は4ヵ月使用後から認められています。)
- 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。
- 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。(本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。)

用法・用量に関する注意

- 用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください。(決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります)
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けてください。
- 薬液のついた手で、目などの粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
- 頭皮にのみ使用し、内服しないでください。
- アルコールなどに溶ける恐れのあるもの(メガネわく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。
- 整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
- 染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。

保管及び取扱い上の注意	<ol style="list-style-type: none"> 使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所を避け、涼しい所に保管してください。 小児の手のとどかない所に保管してください。 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。 火気に近づけないでください。 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
-------------	---

総額(本体価格+税)	7,400円(7,048円+352円)	包装	60mL
------------	---------------------	----	------

商品に関するお問い合わせはこちらへ 大正製薬お客様119番室 電話 03-3985-1800



大正製薬

東京都豊島区高田3丁目24番1号