



デリケートゾーンのかゆみ・かぶれに **フェミニーナ軟膏S**

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保管してください。
使用期限(チューブ底および外箱側面に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。



Vagisil® **フェミニーナ軟膏S**

べたつかないクリームタイプのかゆみ止め薬

Feminina Nankô
(Anti-Itch Ointment)

非ステロイド剤

医薬品

鎮痒消炎剤

販売名：フェミニーナ軟膏S

■製品特徴

- ①有効成分がしつこいかゆみや炎症を鎮めます。
- ②殺菌剤が雑菌の発生を抑えます。
- ③低刺激性で肌にやさしくしみません。
- ④親水性クリームなのでべたつきません。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと 目や目のまわり、口唇

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 乳幼児 (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 湿潤やただれのひどい人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合 (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ

■効能・効果

かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮ふ炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ

■用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布してください

〈用法および用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること 万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること

※ 同じ部位に他の外用剤との併用は避けること
※ 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと

■成分・分量（100g中）

リドカイン	2.0g	（局所麻酔薬）	知覚神経を麻痺させカユミを緩和します。
酢酸トコフェロール	0.3g	（ビタミンE）	血行を促進して肌の新陳代謝を高めます。
塩酸ジフェンヒドラミン	2.0g	（抗ヒスタミン剤）	カユミの発生を抑えます。
イソプロピルメチルフェニール	0.1g	（殺菌剤）	雑菌の発生を抑えます。

添加物としてエデト酸Na、濃グリセリン、パラベン、ペヘニルアルコール、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ミリスチン酸イソプロピル、モノステアリン酸グリセリン、ラノリンアルコール、流動パラフィンを含有する

〈保管及び取り扱い上の注意〉

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと

……こんな症状にお使いください……

●生理時のカユミ

生理時のカユミの原因の多くは月経中に使用されるナプキンや、タンポンのひもの刺激によって引き起こされる皮ふ炎です。また、経血の刺激によって起こる場合もあります。このようなイライラするかゆみは、このフェミニーナ軟膏ですばやく鎮めましょう。

●陰部周辺部のカユミ

見た目には皮ふに何の異常もないのに激しいカユミがある陰部周辺部のカユミ。原因はさまざまですが、かくとますます悪化させてしまいます。このような場合にもこのフェミニーナ軟膏でカユミをすばやく鎮めましょう。

●あせも

つい汗の手入れを怠ったばかりにできるあせも。かゆいからといってかいてしまつては、他の疾病が起こる原因となります。フェミニーナ軟膏でカユミ・炎症を鎮め、自然の治ゆを待ちましょう。

●おりものによるカユミ

健康な女性なら誰でもおりもの不快感に悩んだことがあるはず。このおりものはそれ自体不快だけでなく、その中に雑菌が繁殖してカユミ・炎症・悪臭などのトラブルを引き起こします。このようなときにも、フェミニーナ軟膏でカユミを抑えましょう。

●下着かぶれ

下着やストッキングなどの繊維刺激によるカユミ・かぶれ。フェミニーナ軟膏は、このようなカユミにも効果があります。また、べたつかないので衣類を汚すこともありません。

●乾燥肌によるカユミ

天候や生活環境によって、肌が乾燥し、カサカサしてることがあります。時には、強いカユミをとまなうことも多く、かけばかくほどかゆくなり、皮ふの表面が炎症を起こしたり、すりむけたりする原因となります。この炎症を悪化させない為にもフェミニーナ軟膏を塗って、早めの治療をおすすめします。

ご注意 5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合には、カンジダ症、トリコモナス症などの可能性があります。必ず医師にご相談下さい。

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-3-6

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

製品のお問い合わせ先
お客様相談室 ☎06(6203)3625
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

10062303
MADE IN PUERTO RICO