

RiUP
PLUS



プラス思考で行こう。リアッププラス、新登場！
強く。太く。発毛。

「ミノキシジル」に発毛環境を整える3つの成分をプラスしました！

発毛環境を考えた「リアッププラス」


有効成分のミノキシジルが、毛包に直接作用し、細胞の増殖やタンパク質の合成を促進することによって発毛効果を発揮します。さらに、その他の3つの成分が頭皮の環境を整え、清涼感を与えます。

「リアッププラス」の特徴。それはミノキシジル+3成分

発毛効果を発揮するミノキシジルに加え、頭皮環境を整える3つの成分＝「酢酸トコフェロール」「l-メントール」「パントテニールエチルエーテル」を新たにプラスしました。それが「リアッププラス」の特徴です。

頭皮を保護する「酢酸トコフェロール」、爽やかで、マイルドな使用感・清涼感を与える「l-メントール」、毛細胞に栄養を補給し、頭皮を健全な状態にする「パントテニールエチルエーテル」。これら3つの成分がより良い頭皮環境を作り上げます。そしてミノキシジルが毛包に直接作用。頭皮に働きかけ、発毛効果を発揮します。

頭皮の環境を整え、清涼感をあたえる



l-メントール

頭皮に清涼感をあたえます

酢酸トコフェロール

皮脂の酸化を防ぎ頭皮を保護

パントテニールエチルエーテル

毛細胞に栄養を補給

ミノキシジル

毛包に直接働きかける発毛成分

発毛、育毛及び脱毛の進行予防

■ミノキシジル

発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。

+ パントテニールエチルエーテル

パントテン酸(ビタミンB5)誘導体で、毛細胞に栄養を補給し、頭皮を健全な状態にします。

+ 酢酸トコフェロール

かゆみやフケの原因となる過酸脂質の生成を防ぎ、頭皮を保護します。

+ l-メントール

頭皮のかゆみをおさえ、爽やかな清涼感をあたえます。



販 売 名	リアッププラス		種 別	医薬品(指定医薬品)										
成分・分量	100mL中 ミノキシジル 1.0g、パントテニールエチルエーテル 1.0g、酢酸トコフェロール 0.08g、 <i>l</i> -メントール 0.3g 添加物：カミツレ油、1,3-ブチレングリコール、pH調節剤、エタノール													
効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。													
用法・用量	成人男性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布する。													
使用上の 注意	⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。) 1. 次の人は使用しないでください。 (1) 未成年者(20歳未満)。(国内での使用経験がありません。) (2) 壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。 (本剤は壮年性 脱毛症でのみ有効です。) (3) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。) (4) 女性。(女性の方は「リアップレディ」をご使用ください。) 2. 次の部位には使用しないでください。 (1) 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。(血圧が下がる等のおそれがあります。) (2) きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。(きず等を悪化させることがあります。) 3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、さけてください。 また、これらを使用する場合は 本剤の使用を中止してください。(これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。) 🗨 相談すること 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。 (1) 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。(壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。) (2) 今までに薬や化粧品によるアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。 (3) 高齢者(65歳以上)。(一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。) (4) 高血圧の人、低血圧の人。(本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。) (5) 心臓又は腎臓に障害のある人。(本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。) (6) 次の診断を受けている人。甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。(甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。) (7) むくみのある人。(むくみを増強させる可能性が考えられます。) 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。 使用後、次の症状があらわれた場合。 <table><tr><td>関係部位</td><td>症 状</td></tr><tr><td>皮 膚</td><td>頭皮の発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ふけ、局所熱感等</td></tr><tr><td>神 経 系</td><td>頭痛、気が遠くなる、めまい</td></tr><tr><td>循環器系</td><td>胸の痛み、心拍が速くなる</td></tr><tr><td>代 謝 系</td><td>原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ</td></tr></table> 3. 1年使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。 脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度。(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。) (壮年性脱毛症以外の 脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。) 4. 使用開始後1年以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。 頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛など。(壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。) その他の注意 (1) 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヵ月間、毎日使用してください。 (本剤の有効性は6ヵ月 間使用した場合に認められています。) (2) 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。 (3) 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。 (本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。) 用法・用量に関する注意 1. 用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください。 (決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります) 2. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。 なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けてください。 3. 薬液のついた手で、目などの粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。 4. 頭皮にのみ使用し、内服しないでください。 5. アルコールなどに溶ける恐れのあるもの(メガネわく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。 6. 整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。 7. 染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。				関係部位	症 状	皮 膚	頭皮の発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ふけ、局所熱感等	神 経 系	頭痛、気が遠くなる、めまい	循環器系	胸の痛み、心拍が速くなる	代 謝 系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ
	関係部位	症 状												
	皮 膚	頭皮の発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ふけ、局所熱感等												
	神 経 系	頭痛、気が遠くなる、めまい												
	循環器系	胸の痛み、心拍が速くなる												
	代 謝 系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ												
	保管及び 取扱い上の 注意	1. 使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所をさけ、涼しい所に保管してください。												
		2. 小児の手のとどかない所に保管してください。												
		3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。												
		4. 火気に近づけないでください。												
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。														
総額(本体価格+税)		5,500円(5,239円+261円)		包 装	60mL									

商品に関するお問い合わせはこちらへ 大正製薬(株)お客様119番室 電話 03-3985-1800



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号